

PRODUKTDATABLAD

Nicotinell, depot plaster

Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning. Nicotinell depotplaster fås i tre styrker (7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer).

Nicotinell depotplaster indeholder nicotin, som er et af indholdsstofferne i tobak. Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem huden.



Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.

7 mg/24 timer: nicotin 17,5 mg
14 mg/24 timer: nicotin 35 mg
21 mg/24 timer: nicotin 52,5 mg

Ingredienser:

Øvrige indholdsstoffer: Eudragit E100. Copolymer baseret på akrylestre og vinylacetat. Papir. Triglycerider, middelkædelængde.

Indikation:

Anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nicotinafhængige i forbindelse med tobaksafvænning.

Hvis du ryger mere end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

- 1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter
- 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, og endeligt
- 1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Hvis du ryger mindre end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

- 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter
- 1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Dosering:

Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud. Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet, for bedst muligt at nedsætte din rygetrang om morgenen. Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 6 måneders brug.

Hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg.

Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder kombinationsbehandlingen.

De første 3-4 uger skal du bruge:

- Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer. *

PRODUKTDATABLAD

Nicotinell, depot plaster

- Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg, normalt 5-6 stykker dagligt.
- Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.

Herefter skal du nedtrappe behandlingen. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af plasteret, imens der bruges det samme antal tyggegummi eller sugetabletter. Til sidst reduceres det daglige forbrug af tyggegummi/sugetabletter.

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Nicotinell depotplastre, hvis du har:

- For nylig haft et hjertesvigt eller hjertestop
- Hjertesygdomme
- Problemer med blodkarsygdomme i hjernen eller med blodcirkulationen
- For højt blodtryk
- Sukkersyge
- En overaktiv skjoldbruskkirtel
- Overaktive binyrer
- Har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion
- Mavesår
- Kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der hvor plasteret har siddet

Advarsler og forsigtighedsregler:

Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billedeundersøgelse) skal du fjerne Nicotinell depotplaster inden undersøgelsen. Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter.

Opbevaring: Ved temperaturer under 25 °C. og steder, der er utilgængeligt for børn

Holdbarhed: Se holdbarhedsdato på emballagen.

Håndtering og destruktion: Aflever altid medicin rester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7552007	Nicotinell	Håndkøbsmedicin plaster 24 timer HF	7 mg	Æske a 7 stk.	012278
7552014	Nicotinell	Håndkøbsmedicin plaster 24 tim. HF	14 mg	Æske a 7 stk.	049964

ANSVARLIGT FIRMA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær
68, 2605 Brøndby